



COMPOSICIÓN

NUTRIENTES	% (P/V)	CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Nitrógeno (N)	6	Densidad 1,37 - 1,39 gr/cc
Potasio (K ₂ O)	5	pH 4,8 - 5,3
Calcio (CaO)	8	Color Verde claro
Magnesio (MgO)	3	Solubilidad Infinita
Boro (B)	0,1	
Bases orgánicas	20,0	

INFORMACIÓN GENERAL

BORMACKAL® SL, es una formulación a base de hidratos de carbono, calcio, potasio, magnesio y boro, formando un compuesto de fácil y rápido ingreso, movilidad y metabolización.

Objetivos

- Eficiencia metabólica, prevención de acumulación de amonio, desarrollo equilibrado.
- Prevención de palo negro, necrosis apical, grano acuoso, ablandamiento y partidura de bayas y frutos.
- Firmeza y consistencia del fruto.

Está vastamente descrito que dichos desórdenes tienen su origen en frecuentes desbalances que ocurren en la primera etapa del período vegetativo, generalmente asociados a condiciones climáticas adversas donde las plantas se ven sometidas a diversos estrés que dificultan la eficiencia de los procesos acometidos, tales como diferenciación floral, división celular de la futura pulpa del fruto, cuaja, etc.

BORMACKAL® SL, tiene como objetivo la prevención de dichos desórdenes, ampliando los umbrales de tolerancia al estrés.

La combinación de los elementos contenidos en **BORMACKAL® SL**, logra evitar el potencial desequilibrio hormonal propio de climas inestables de primavera, mejorar la eficiencia en la capacidad fotosintética disminuyendo el riesgo de acumulación de amonio a niveles tóxicos, favorecer el buen desarrollo del sistema vascular de la planta en su vegetación nueva y en particular en la conexión con el fruto, beneficiar la catalización de los procesos en que la planta está involucrada y aportar los suficientes hidratos de carbono previendo días en que el clima no permitirá un eficiente proceso de Fotosíntesis.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	DOSIS LT/HÁ	Nº APLIC.	OBSERVACIONES
Vides	3 - 4	2 - 6	<ul style="list-style-type: none"> • A partir de brotes de 20 cm, repetir cada 7 días. • Prepinta, repetir a los 7 días.
Pomáceas	3 - 4	2 - 6	<ul style="list-style-type: none"> • A partir de puntas verdes, repetir cada 7 días • A partir de 15 días antes del quiebre de color, repetir a los 7 días
Carozos	3 - 4	2 - 6	<ul style="list-style-type: none"> • A partir de botón verde, repetir cada 7 días • A partir de 15 días antes del quiebre de color, repetir a los 7 días.
Cítricos y Paltos	3 - 4	2 - 6	<ul style="list-style-type: none"> • A partir de inicio de flash vegetativo de primavera, repetir cada 7 días.
Berries	3 - 4	2 - 6	<ul style="list-style-type: none"> • A partir de botón floral, repetir cada 7 días.
Kiwi	3 - 4	2 - 6	<ul style="list-style-type: none"> • A partir de brotes de 20 cm, repetir cada 7 días. • 50 y 40 días pre cosecha.
CULTIVOS	CC/100 LT.	Nº APLIC.	OBSERVACIONES
Hortalizas: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, aji, sandía, etc.	300	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> • A partir de 10 días del transplante, emergencia o brotación, según cultivo. • Repetir cada 7 días.
Cereales	300	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> • A partir de 10 días post emergencia.
Leguminosas	300	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> • A partir de 10 días post emergencia.



Certificado N° CL. 102.106
Certificado N° CL. 7872



COMPATIBILIDAD

Incompatible con fosfatos. Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes, sin embargo atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.

Fabricado por NVA S.A.

El Roble 215-A Lampa, Santiago - Chile.
Fono - Fax: (56-2) 2738 95 13 • 2738 94 05
Sucursal Coquimbo - IV Región • Fono: (02) 594 03 21

nva.nva.cl • www.nva.cl