

FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO SOLUBLE A BASE DE POTASIO



COMPOSICIÓN

NUTRIENTES	% (P/V)	CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Potasio (K ₂ O)	25	Densidad	1,22 - 1,24 gr/cc
Bases orgánicas	30,0	pH	6 - 7
		Color	Marrón oscuro
		Solubilidad	Infinita

INFORMACIÓN GENERAL

Foliafeed K® SL, es una formulación líquida sobre la base de humatos de potasio más agentes que facilitan su absorción y traslocación.

El potasio contenido en Foliafeed K® SL, actúa en la catalización de procesos, desempeña un papel esencial en la economía del agua al regular la apertura y cierre de los estomas, es un elemento activador de enzimas, participa en el transporte de carbohidratos y la síntesis de proteínas.

Foliafeed K® SL, debido a su alto y eficiente contenido elemental, es capaz de aumentar los solutos intracelulares, modificando el umbral de congelamiento. Puede ser usado como prevención de heladas. Dosis de 400cc/100 litros de agua ayudarán en la protección del cultivo por 8-10 días.

VENTAJAS Y FORMAS DE ACCIÓN DE Foliafeed K® SL:

- Estimula la síntesis y transporte de carbohidratos en la planta.
- El Potasio contenido en Foliafeed K® SL, favorece la movilización de nutrientes, mejorando tanto el proceso de llenado y maduración del fruto, como la calidad y consistencia de éste.
- En post-cosecha mejora el flujo de carbohidratos hacia órganos de almacenamiento (reservas de la planta).
- Aumenta la resistencia de las plantas sometidas a estrés hídrico.
- Favorece la uniformidad de la cosecha.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	LITROS/HÁ.	Nº APLIC.	OBSERVACIONES
Vides	3 a 4	2 - 3	• Desde 30 días antes de pinta, repetir a los 15 días. Realizar una tercera aplicación en fruta de color a inicio de pinta.
Pomáceas	3 a 4	3 - 4	• Desde fruto 2,5 cm. hasta 20 días antes de la cosecha.
Carozos	3 a 4	3	• Desde endurecimiento del carozo a quiebre de color.
Cítricos y Palto	3 a 4	3	• Con brotes en activo crecimiento de primavera. Repetir cada 7 días.
Berries	3 a 4	3 - 4	• Desde floración, repetir cada 7 días.
Kiwi	3 a 4	3	• 60 - 45 y 30 días antes de cosecha.
CULTIVOS	CC/100 LT.	Nº APLIC.	OBSERVACIONES
Hortaliza: Lechuga, beterraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.	250 a 350	3 - 6	• Hortalizas de hoja o tallo, desde 20 días después del trasplante, emergencia o brotación, según cultivo. Repetir cada 15 días. • Hortalizas de fruto, a partir de la cuaja de los primeros frutos. Repetir cada 7 - 10 días. • Tubérculos y raíces, a partir de 40 días previos a la cosecha. Repetir a los 10 y 20 días.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes foliares. Atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.



Certificado N° CL. 102.106
Certificado N° CL. 7872



Fabricado por NVA S.A.
El Roble 215-A Lampa, Santiago - Chile.
Fono - Fax: (56-2) 2738 95 13 • 2738 94 05
Sucursal Coquimbo - IV Región • Fono: (02) 594 03 21
nva@nva.cl • www.nva.cl